

NOCE

juglans regia



Il gemmoderivato di **noce** ha una buona azione antinfiammatoria, antibatterica, cicatrizzante ed è anche un ottimo drenante epatico, grazie alla stimolazione delle cellule di Kupferr, che contribuiscono a fagocitare le tossine.

Ha un' importante risonanza a livello pancreatico ed è utile quindi nelle pancreatiti e nei disturbi della regolazione degli zuccheri.

Molto interessante anche la sua azione di riequilibrio sul microbiota intestinale, che ha come conseguenza la riduzione della sindrome dell'intestino permeabile, problema piuttosto comune che, aumentando di gran lunga l' assorbimento di tossine digestive, porta poi all' aumento di intolleranze e problemi intestinali e all'indebolimento conseguente dell' intero sistema.

Utile in diversi problemi dermatologici, dall' acne alle dermatosi caratterizzate da pustole ed essudati.

Se ne consiglia l' uso anche a livello linfatico e ghiandolare.

PRINCIPALI EFFETTI FITOTERAPICI

Importante proprietà digestiva , amaro-tonica.

Profonda azione depurativa.

Favorisce il benessere della pelle.

Azione antibatterica, fungicida, antinfiammatoria.

Azione astringente intestinale.

Modulazione degli zuccheri e della glicemia (effetto ipoglicemizzante).

UTILIZZO PER I BAMBINI

Crosta latte, dermatiti ed eczemi, sostegno al microbiota intestinale dopo cure antibiotiche, tonsilliti e otiti ripetute, bronchiti e muco, mononucleosi, stafilococco, streptococco e infezioni di natura batterica, diarrea post antibiotici.

UTILIZZO PER GLI ADULTI

Infiammazioni croniche, alterazioni glicemiche, comedoni e acne, dermatosi ed eczemi, micosi, verruche, disbiosi e squilibri del microbiota, alitosi, intestino permeabile, meteorismo, blefarite, colazio, infiammazioni delle mucose genitali, sinusite.

NOTA PSICOSOMATICA

Fluire nei cambiamenti e nelle trasformazioni interiori ed esteriori.

AVVERTENZE. Le uniche avvertenze sono relative a soggettive e personali sensibilità individuali al fitocomposto.

È consigliabile consultare un professionista in caso di utilizzo concomitante di farmaci antidiabetici in trattamento.

